

Decreta:

È autorizzata, secondo il testo autentico e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, l'estensione a durate comprese tra due e nove anni dei tassi di premio approvati per la tariffa di capitale differito rivalutabile a premio annuo costante, approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1986, presentati dalla società per azioni Sara vita, con sede in Roma. L'applicazione dei predetti tassi deve essere limitata ai casi riportati nella nota allegata al citato decreto ministeriale 20 giugno 1986 regolanti «i criteri per l'assunzione di polizza di breve durata relativamente alle tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili».

Roma, addì 20 febbraio 1987

*Il Ministro: ZANONE*

87A2209

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 dicembre 1986.

**Modificazione alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282 che, modificando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle di cui all'art. 88 medesimo;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1976 che ha aggiornato le suddette tabelle;

Considerata l'opportunità di aggiornare ulteriormente le suddette tabelle di dotazione dei medicinali e di meglio individuare i limiti di applicabilità del citato decreto interministeriale 21 maggio 1976 al naviglio mercantile;

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto, dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura ed utensili vari indicati nell'elenco allegato.

Roma, addì 24 dicembre 1986

*Il Ministro della sanità*  
DONAT CATTIN

*Il Ministro della marina mercantile*  
DEGAN

## ISTRUZIONI

TABELLE:

*Tabella A:* quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui debbono essere dotate le navi abilitate alla:

*navigazione nazionale litoranea*, così come definita nella tabella A, al punto 52, contenuta nel regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

*pesca costiera locale*, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

*navigazione nazionale ed internazionale costiera*, così come definita nella predetta tabella A, del regolamento di sicurezza ai punti 51 e 49;

*pesca costiera ravvicinata*, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del citato regolamento per la pesca marittima.

Sono comprese nell'obbligo di avere in dotazione il materiale sanitario previsto da questa tabella le imbarcazioni da diporto così come definite dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abilitate alla navigazione senza alcun limite.

*Tabella B:* quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui debbono essere provviste le navi abilitate alla:

*navigazione nazionale*, così come definita nella citata tabella A, del regolamento di sicurezza, al punto 50;

*pesca mediterranea o d'altura*, così come definita nel paragrafo 9, comma quarto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

*Tabella C:*

*navigazione internazionale breve e lunga*, così come definita nella citata tabella A del regolamento di sicurezza, ai punti 48 e 47;

*pesca oltre gli stretti od oceanica*, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

Sono comprese nell'obbligo di avere in dotazione il materiale sanitario previsto da questa tabella le navi da diporto così come definite dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51.

Per gli articoli seguiti da doppio asterisco (\*\*), sulle navi petroliere o imbarcanti carichi pericolosi, la quantità deve essere triplicata (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; decreto ministeriale 10 settembre 1969).

## A MEDICINALI PER USO INTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C	Istruzioni per l'uso
<b>I Analgesici:</b>					
1) Morfina.	Fiale da 1 ml con 10 mg Etichettare «stupefacente» Si trova tra gli stupefacenti affidati al comandante	—	—	10	Sempre e solo dietro consiglio medico, dato in chiaro. Eccezionalmente può essere somministrata una fiala intramuscolo, senza consiglio medico in caso di violentissimo dolore retrosternale, che non passa in seguito alla somministrazione di due compresse di trinitrina
2) Naloxone.	Fiale da 0,4 mg	—	—	1	Sempre e solo dietro consiglio medico, dato in chiaro. Antidoto nel trattamento degli effetti tossici dei narcotici. Una fiala per via i.m., e.v., o sottocute
3) Pentazocina	Fiale da 1 ml/30 mg Compresse da 50 mg	— —	5 20	10 40	Può essere somministrata una fiala in caso di urgenza, quando l'origine del dolore è chiara (es. fratture, ustioni), da non somministrare, senza consiglio medico, nei dolori addominali, nei traumi cranici, nelle cefalee
<b>II Analgesici Antipiretici Antireumatici:</b>					
4) A base di acido acetilsalicilico	Compresse da 500 mg gastroresistenti	20	20	100	Una-due compresse, ripetibili ogni 6-8 ore, a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite o di ulcera gastrica
5) A base di derivati pirazolici	Compresse da 100 mg	10	20	100	In caso di febbre o dolori di media entità (reumatismo, dolori muscolari, nevralgie, mal di testa e manifestazioni di tipo influenzale o da raffreddamento), una-due compresse, ripetibili ogni 8 ore a stomaco pieno
<b>III Analgesici Antispastici:</b>					
	Discoidi 10 mg Supposte 10 mg Fiale 5 ml	20 — 3	20 — 3	40 20 15	In caso di dolori viscerali, tipo coliche di fegato, coliche renali, coliche intestinali, dolori premenstruali e mestruali, 1 discoide, ripetibile dopo 2 ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una supposta, ripetibile dopo 2 ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una fiala intramuscolare ripetibile dopo 4 ore. Se il dolore non passa, consultare, al più presto un medico
<b>IV Anestetici locali:</b>					
7) Lidocaina.	Flaconi da 0,5%-50 cc	—	—	1	Anestetico locale da usarsi in chirurgia per l'anestesia di infiltrazione terminale o di superficie. Da usare in caso di effettiva necessità in quantità ridotta solo su indicazione medica
<b>V Antiacidi:</b>					
8) A base di idrato di alluminio-colloidale	Compresse da 500 mg	—	50	100	Nei casi di acidità di stomaco: 1-2 compresse da masticare alla comparsa di bruciore di stomaco
9) A base di H <sub>2</sub> antagonisti	Compresse Fiale	— —	1 scat. 1 scat.	1 scat. 1 scat.	In caso di ulcera peptica e sue complicanze. Solo su indicazione medica
<b>VI Antiasmatici:</b>					
10) A base di aminofillina	Compresse Fiale da 3 ml	— —	— —	30 10	Da somministrare solo dietro prescrizione medica: in caso di dispnea (difficoltà di respiro), in attesa di mettersi in contatto col medico, somministrare una fiala intramuscolo
11) A base di betastimolanti	Fiale	—	1 scat.	1 scat.	In caso di crisi asmatica grave. Solo su prescrizione medica
12) Salbutamolo	Spray-Flac. 20 mg	—	1	3	Broncodilatatore nel trattamento dell'asma bronchiale, bronchite asmatica, enfisema polmonare. Da usare con precauzione nell'ipertensione e nelle cardiopatie

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C	Istruzioni per l'uso
<b>VII Antibiotici e sulfamidici:</b>					
13) Ampicillina	Capsule 500 mg Flaconi 1 g	— —	24 —	60 12	Nei casi di infezioni con febbre (otiti, tonsilliti, bronchiti, polmoniti etc.). Prima di iniziare la somministrazione, 1 capsula ogni 6 ore per via orale o 1 flacone ogni 8-12 ore per via intramuscolare, consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche (orticaria o altro)
14) Cefalosporine (ceftazidima o ceftriaxone)	Flaconi 1 g	—	—	10	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrazione dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 8-12 ore (ceftazidina) o ogni 12-24 ore (ceftriaxone)
15) Cloranfenicolo	Capsule 250 mg	—	—	36	Nei casi di febbre tifoide, in alcune infezioni intestinali e veneree etc. Somministrazione solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 2 capsule ogni 6 ore
16) Gentamicina	Flaconi da 80 mg	—	—	12	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 12 ore (effetti secondari o tossici sul rene e sull'udito)
17) Tetraciclina	Capsule 250 mg	—	—	80	Nei casi di brucellosi, infezioni dell'apparato respiratorio, in alcune infezioni veneree, ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 2 capsule ogni 6 ore per via orale (può dare reazioni cutanee in caso di esposizione al sole)
18) Codrimosazolo	Compresse	—	20	80	Nei casi di infezione con febbre (infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni urinarie, infezioni intestinali ecc.). Prima di iniziare la somministrazione alla dose di due compresse ogni 12 ore per via orale consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche
19) Spectinomycin.	Fiale 2 g	—	—	20	In caso di blenorragia somministrare per via intramuscolare su prescrizione medica
<b>VIII Antidiabetici:</b>					
20) Insulina ad azione pronta per via ipodermica	Flaconi 400 UI	—	—	2	Somministrare solo su consiglio medico, dato in chiaro: con siringhe apposite munite di ago ipodermico. L'uso dell'insulina è subordinata al controllo della glicemia e della glicosuria a mezzo delle strisce reattive
21) A base di sulfanilure e biguanide	Compresse	—	—	1 scat.	1-3 Compresse al dì su prescrizione medica
<b>IX Antidiarroici e reidratanti:</b>					
22) A base di loperamide	Compresse da 2 mg	—	—	30	Antidiarroico ad azione antiperistaltica: nelle diarree acute di varia origine fino a 16 mg al giorno per uso orale da usarsi solo su prescrizione medica
23) Miscela glucosalina. Per soluzione estemporanea in acqua	Confezione × 10 L	—	—	2	Reidratante da somministrare per via orale
<b>X Antiemetici a base di:</b>					
24) Metoclopramide o domperidone	Supposte	—	1 scat.	2 scat.	In caso di nausea e vomito incoercibili

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C	Istruzioni per l'uso
<b>XI Antiemorragici:</b>					
25) A base di acido tranexanico	Fiale da 5 ml per uso-intramuscolare	5	5	10	In caso di emorragia abbondante e persistente. Una fiala intramuscolo, ripetibili dopo due ore. In caso di ferita con emorragia abbondante e continua o a fiotti, anche dopo applicazione del laccio una fiala intramuscolo dopo mezz'ora e poi dopo due ore. Inoltre può essere utile applicare sulla parte, garze sterili o cotone imbevuti del medicinale. In caso di emorragie viscerali (es.: emetisi, vomito di sangue, emissione di feci nere) iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico
26) Emostatici uterini a base di ergotamina	Gocce flaconi Fiale 1 cc	— —	— —	1 1 scat.	Solo su indicazione medica
<b>XII Antimalarici:</b>					
27) Chinino bisolfato.	Compresse 20 mg	—	—	100	Terapia dell'accesso febbrile malarico: iniziare con 3 compresse per via orale in singola somministrazione, continuando con 2 compresse ogni 6 ore per 10 giorni o secondo prescrizione medica
28) Cloroquina	Compresse 250 mg	—	—	100	Profilassi: 2 compresse in singola somministrazione, 1 volta alla settimana, iniziando 2 settimane prima dell'ingresso in zona malarica e proseguendo per tutto il periodo di permanenza e per altre 6 settimane dopo aver lasciato la zona malarica. Terapia: somministrare 4 compresse come prima dose; dopo 6 ore dalla prima dose, altre due compresse (2 <sup>a</sup> dose); dopo 24 ore dalla prima dose, altre 2 compresse (3 <sup>a</sup> dose); dopo 48 ore dalla prima dose, altre 2 compresse (4 <sup>a</sup> dose)
29) Sulfametopirazina e pirimetamina	Compresse 500 mg S Compresse + 25 mg P.	—	—	20	Può dare reazioni allergiche gravi in persone sensibili ai sulfamidici. Terapia: qualora la malaria sia contratta in zone dove esistono ceppi di parassita malarico-resistente alla cloroquina: somministrazione per via orale 2 compresse (peso corporeo 50-70 kg) o 3 compresse (peso corporeo superiore a 70 kg) in dose unica, iniziando anche il trattamento con chinino (vedi) o secondo prescrizione medica
<b>XIII Antinfiammatori e decontratturanti:</b>					
30) A base di suprofen (ved. prodotto del commercio e istruzioni)	Confetti 200 mg Supposte 300 mg	— —	— —	30 10	Da usare solo su consiglio medico. In caso di osteoartrosi in fase dolorosa e nelle sindromi collerate (lombalgia, sciatalgia etc.) gotta. Non somministrare in caso di ulcera, gastrite o in casi di allergia
31) Prindolo.	Fiale	—	5	5	Nel trattamento di contratture della muscolatura (lombaggini, torcicollo etc.). Da somministrare su consiglio medico
<b>XIV Antipertensivi e coronarodilatatori:</b>					
32) Ipertensivi a base di clonidina cloridrato	Compresse da 0,150 mg	—	—	30	Vasodilatatore e ipertensivo associabile ai cardiotonici controindicato nell'alcolismo e nell'abuso degli ipnotici
33) Coronarodilatatori a base di nitroglicerina ad assorbimento percutaneo	Cerotti da 10 cm	—	—	5	Vasodilatatore coronarico negli attacchi anginosi e stenocardici
34) Coronodilatatori a base di trinitrina	Pillole da 0,3 mg	—	70	70	In caso di dolore violento nella zona precordiale sinistra o retrosternale, esteso, eventualmente anche al braccio sinistro, con senso di angoscia, di costrizione toracica e di morte imminente. Una pillola da porre sotto la lingua e lasciare fino al completo assorbimento da ripetere dopo 5 minuti, se occorre. Se il dolore persiste dopo due pillole di trinitrina, consultare con urgenza un medico. Qualora ciò sia impossibile, ricorrere alla morfina: una fiala intramuscolo di morfina ed una fiala intramuscolo di analettico

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C	Istruzioni per l'uso
<b>XV Antistaminici Antiallergici Antishock.</b>					
35) A base di didesclorfeniramina maleato	Compresse 2 mg	30	30	60	In caso di allergia tipo orticaria o in caso di raffreddore da fieno, somministrare tre compresse al giorno, ovvero secondo prescrizione medica
36) A base di metilprednisolone	Fiale da 20 mg	1 scat.	1 scat.	2 scat.	In caso di reazioni allergiche gravi. Da usare dietro consiglio medico
37) A base di cortisone iniett. (idrocortisone succinato)	Fiale da 100 mg	—	—	5	In caso di allergia grave, ivi compresa quella alla penicillina ed altri antibiotici, con respiro difficoltoso a tipo di asma, eruzioni cutanee tipo orticaria, diminuzione grave della pressione (collasso). Iniettare una fiala intramuscolo e consultare con urgenza un medico
<b>XVI Cardiotonici e antiaritmici:</b>					
38) Digitale (lanatoside C)	Confetti 0,250 mg Fiale 0,4 mg	—	6	12	Da somministrare solo su prescrizione medica
39) Antiaritmici a base di chinidina	Capsule 200 mg	—	20	20	Da somministrare solo su prescrizione medica.
40) Antiaritmici a base di atmalina	Capsule 75 mg	—	—	20	Da somministrare solo su prescrizione medica
41) Simpatico mimetici adrenalina	Fiale 1 cc	—	6	6	Per uso sottocutaneo: in caso di shock; da usare su prescrizione medica
<b>XVII Diuretici:</b>					
42) A base di furosemide	Compresse da 25 mg Fiale 2 cc/20 mg	—	—	30	Somministrare solo su consiglio medico
43) A base di acetazolamide	Compresse 250 mg	—	—	12	Indicato in caso di glaucoma. Somministrare solo su consiglio medico
<b>XVIII Lassativi:</b>					
44) Lassativo liquido	Gocce	—	—	3 flac.	8-10 gocce ripetibili una sola volta nelle 24 ore
45) Supposte di glicerina		+	10	10	In caso di stitichezza. Prima di somministrare qualsiasi lassativo per via orale tentare l'applicazione di una-due supposte
<b>XIX Sedativi:</b>					
46) A base di clorpromazina	Compresse da 25 mg Fiale da 50 mg	—	—	25	Da somministrare solo su prescrizione medica
47) A base di barbiturici	Compresse da 100 mg	—	20	40	Da somministrare solo dietro consiglio medico
48) A base di benzodiazepina	Gocce-flaconi da 20 cc/2 mg Fiale 10 mg	—	1	3	Da somministrare solo su consiglio medico
<b>XX Soluzioni per uso endovenoso e/o ipodermico:</b>					
49) Soluzione fisiologica	Flaconi da 500 ml	—	3	4	In caso di abbondante perdita di liquidi (emorragie, ustioni, schiacciamento, vomito persistente e abbondante, diarrea abbondante e persistente): somministrare sotto cute o endovena 1 flacone di soluzione fisiologica, facendo scendere il liquido alla velocità di 40-60 gocce al minuto. In seguito attenersi al consiglio medico
50) Soluzione glucosata	Flaconi da 500 ml	—	—	3	(Vedi 49)
51) Plasma liofilo con acqua bidistillata (sostituti del plasma)	Flaconi da 500 ml	—	—	3	(Vedi 49)
<b>XXI Vitamine:</b>					
52) Polivitaminici complesso B	Confetti	—	—	40	In caso di terapia antibiotica somministrare 2-3 confetti al giorno. Come ricostituente 1-2 confetti al giorno
53) Vitamina B1-B12-B6	Fiale	—	—	12	In caso di dolori nevralgici praticare: una fiala intramuscolo ogni 24 ore

## B - MEDICINALI PER USO INTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C	Istruzioni per l'uso
<i>Colliri:</i>					
54) A base di ossibuprocaina	Flaconi con contagocce oftalmico 20 ml	1	1	1	Secondo prescrizione medica
55) Collirio antisettico con antibiotico e cortisone	Flaconi con contagocce oftalmico	—	—	2	Vedi sopra
56) Collirio a base di atropina	Flaconi con contagocce oftalmico da 10 ml	—	—	1	Solo su espressa indicazione medica
57) Collirio a base di pilocarpina	Flacone con contagocce oftalmico 1% da 10 ml	—	—	1	Da usarsi nel caso di glaucoma solo su espressa indicazione del medico.
<i>Colluttori gocce:</i>					
58) Antisettico per uso orale	Flaconi con contagocce	—	—	1	In caso di irritazione delle gengive e della parte interna delle guance e della lingua e, comunque, nei casi di infiammazione del cavo orale 20 gocce in mezzo bicchiere d'acqua per sciacqui (non ingoiare)
59) A base di naftimetil inidazolina nitrato (uso nasale)	Flaconi con contagocce 10-15 ml	—	—	1	In caso di raffreddore con abbondante muco e naso chiuso: somministrare due gocce per ogni narice, ogni 4-5 ore
60) Gocce antidontalgie (contro il mal di denti)	Flaconi o fialette	1	1	1	In caso di dolore provocato da denti cariati applicare un batuffolo di cotone, imbevuto nel liquido del flaconcino o il contenuto della fiala, sul dente dolente
61) Gocce antiotalgiche (a base di antibiotici e antinfiammatori)	Flaconi con contagocce da 10 ml	—	—	1	In caso di infiammazione dell'orecchio, con dolore: due gocce in ogni orecchio 3-4 volte al giorno. Attenzione: nel caso vi sia anche una secrezione muco-purulenta o si abbia febbre, consultare un medico
<i>Lozioni antiparassitarie:</i>					
62) A base di dimetilfenilene	Flaconi 100 g	—	—	1	
<i>Pomate:</i>					
63) A base di prometazina	Crema o pomata 2% tubetti	1	1	3	Antiallergico per applicazioni locali: può causare disturbi dopo esposizione al sole
64) A base di aureomicina	Tubi pomata da g 30	—	1	1	
65) Antiemorroidaria a base di idrocortisone	Tubetti da 15 g	—	1	2	Applicazioni locali 2 volte al giorno
66) A base di econazolo nitrato	Crema 1% tubetti	—	—	3	Antimicotico: applicazioni locali 2 volte al giorno
67) Contro le ustioni (1)	Spray da 100 g flac. o tubetti pomata 30 g	1	1	3	Applicare come primo intervento sulla parte ustionata, coprire con garza sterile e consultare il medico
68) Pomata uretrale	Tubetti 6+10 g	—	—	1	Per il cateterismo uretrale
69) Pomata oftalmica con antibiotico	Tubetti	—	1	2	
<i>Potabilizzanti dell'acqua:</i>					
70) A base di cloro		—	—	—	Attenersi alle apposite istruzioni
<i>Disinfettanti liquidi per uso esterno:</i>					
71) Acqua ossigenata a 12 vol.	Grammi	100	200	500	
72) Alcool denaturato	Litri	—	1	3	
73) Tintura di iodio	Grammi	50	50	100	Usare solo sulla pelle circostante, mai sulla ferita
74) Altri disinfettanti a base di ammonio quaternario	Flaconi da cc 250	1	2	10	
<i>Insetticidi:</i>					
75) Insetticida ad azione residua	Flaconi da 1 litro	—	1	6	

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C	Istruzioni per l'uso
76) Liquido insetticida a base di piretro (2)	Flaconi piretrina 25% uso esterno	—	—	1 flac. per ogni membro dell'equipaggio nelle navi su rotte tropicali	
77) Polvere insetticida	Barattoli da 50 g uso esterno	—	—	1	

(1) Per le navi petroliere e trasportanti materiali infiammabili (dotazione quintupla).  
 (2) A seconda dei quantitativi d'acqua da trattare.

## C MATERIALE PER MEDICAZIONE

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C
78) Ago e tubi di plastica per fleboclisi sterili		—	3	10
79) Ambu-pallone per rianimazione (**).		—	1	1
80) Ammoniaca flaconi	In flaconi di vetro scuro	1	1	1
81) Bacinella reniforme.		—	—	2
82) Barella a canoa.		—	—	1
83) Bende di Cambric (m 5 × cm 8) (**)		5	10	20
84) Bende di Cambric (m 8 × cm 10) (**)		5	10	20
85) Bende di mussola idrofila (m 5 × cm 5) (**)		2	5	10
86) Bende di mussola idrofila (m 5 × cm 12) (**)		—	2	5
87) Bende di mussola idrofila (m 5 × cm 20) (**)		—	1	1
88) Bende di rete elastica tubolare (confezioni).		—	1	1
89) Benzina grammi		—	—	500
90) Bicchiere graduato a calice di vetro.		—	—	1
91) Bombola ossigeno litri 1000, completa di maschera gorgogliatore e occhiali (**)		—	—	1
92) Borsa di gomma per acqua calda (**)		—	1	2
93) Borsa di tela gomma per ghiaccio (**)		—	1	2
94) Busta chirurgica	Contenuto: aghi di sutura atraumatici già pronti forbice chirurgica curva forbice chirurgica retta manico da bisturi con lame intercambiabili pinza anatomica pinza emostatica di Klemmer pinza emostatica Pean pinza porta aghi n. 2 pinze a denti di topo (durante) porta caustico con cannello di nitrato d'argento portastuelli per medicazione degli orecchi seta per sutura n. 0-1-2 (tubetti sterili) sonda scanalata specchio	—	—	1

Articolo	Istruzioni per il farmacista	A	B	C
95) Camice monouso . . . . .		—	—	2
96) Catetere Foley uretrale monouso . . . . .	Calibro n. 18	—	—	2
97) Cerotto adesivo (m 5 × cm 2,5) (**). . . . .		1	2	4
98) Cerotto medicato (**). . . . .	Scatole	1	1	2
99) Cerotto adesivo (m 5 × cm 5) (**). . . . .		1	1	3
100) Acquavite di vino. . . . .	Litro	—	—	2
101) Cotone di Germania . . . . .	Pacchi da 250 g	—	—	2
102) Cotone idrofilo . . . . .	Pacchi da 250 g	1	2	5
103) Elenco dei dispensari deanoceltici e per la cura delle malattie veneree nei porti	Publicato dall'Organizzazione mondiale della sanità	—	—	2
104) Etere solforico. . . . .	In boccette da g 100	—	—	2
105) Ferule di fil di ferro . . . . .		+	—	1
106) Fogli per registrazione temperature. . . . .		—	—	10
107) Fondendoscopio. . . . .		—	1	1
108) Forbice comune. . . . .		1	1	1
109) Fornelletto . . . . .		—	1	1
110) Fornelletto elettrico (cm 50 × 40 × 40). . . . .		—	—	1
111) Garza idrofila compresse (cm 12 × 15) (**). . . . .	Buste da 10	1	2	5
112) Garza idrofila compresse (cm 30 × 30) (**). . . . .	Buste da 10	1	2	5
113) Garza vaselinata compresse (cm 10 × 10) (**). . . . .	Buste da 10	—	1	3
114) Guanti monouso . . . . .	Confezioni	—	—	1
115) Laccio emostatico. . . . .		1	1	1
116) Manuale di pronto soccorso . . . . .	(Guida internazionale di bordo)	1	1	1
117) Mutanda elastica . . . . .		—	—	1
118) Pacchetti sterili di medicazione (**). . . . .	Tipo 18 × 40	1	1	2
	Tipo 10 × 10	1	1	2
119) Padella in plastica . . . . .		—	—	1
120) Pappagallo in plastica . . . . .		—	—	1
121) Pera di gomma . . . . .	Da g 200	—	—	1
122) Sfigmomanometro. . . . .		—	1	1
123) Siringone da irrigazione . . . . .		—	—	1
124) Siringhe da insulina monouso. . . . .		—	—	5
125) Siringhe monouso da cc 5. . . . .		2	10	60
Siringhe monouso da cc 10. . . . .		2	5	10
126) Sondino naso-gastrico . . . . .		—	—	2
127) Abbassalingua monouso . . . . .	Confezione	—	—	1
128) Stecche palmari in legno. . . . .	Confezione	—	1	1
129) Stecche per fratturari. . . . .	Confezione	1	1	1
130) Doccia per arto superiore . . . . .		—	1	1
Doccia per arto inferiore . . . . .		—	1	1
131) Sterilizzatore elettrico (misura 18 × 5 × 8 cm)		—	—	1
132) Strisce reattive per ricerche varie in un'unica soluzione: albumina - sangue - glucosio - acetone	Confezione	—	—	1
133) Termometro clinico. . . . .		1	1	2
134) Lavaocchi in plastica. . . . .		—	—	1
135) Tamponi oculari . . . . .	Buste	—	—	1
136) Triralingua. . . . .		—	—	1