

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 23 maggio 1975, 6 dicembre 1975 e 4 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna) è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

TOROS

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

ANDREOTTI

*p. Il Ministro per il tesoro*

FABBRI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DONAT-CATTIN

(8191)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

**Rettifica al decreto ministeriale 17 settembre 1975, concernente il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nella regione Piemonte nell'anno 1975.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 17 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 15 aprile 1976, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro il carattere di eccezionalità della grandinata del 17 maggio 1975 verificatasi nella provincia di Vercelli, ai fini dell'applicazione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerato che la data 17 maggio 1975, tale trascritta nel decreto cui si fa riferimento, per mero errore, deve intendersi « 17 giugno 1975 »;

Attesa la richiesta di rettifica della regione Piemonte;

Decreta:

Nel decreto interministeriale 17 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 15 aprile 1976, dove è detto « Vercelli - grandinata del 17 maggio 1975 (art. 7) » deve leggersi « Vercelli - grandinata del 17 giugno 1975 (art. 7) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

MARCORA

*p. Il Ministro per il tesoro*

FABBRI

(8101)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

**Medicinali, oggetti di medicatura e utensili di cui debbono essere provviste le navi mercantili senza medico di bordo.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282;

Considerata l'opportunità di aggiornare le tabelle dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari indicati nell'elenco allegato.

Roma, addì 21 maggio 1976

*Il Ministro per la sanità*

DAL FALCO

*Il Ministro per la marina mercantile*

GIÒIA

ISTRUZIONI

Tabella:

tabella A: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui debbono essere dotate le navi da traffico portuale e di rada, da traffico giornaliero costiero, pescherecce e da diporto;

tabella B: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi adibite al piccolo traffico ed alla pesca in alto mare;

tabella C: quantità minima indispensabile del materiale sanitario per le navi da carico addette ai viaggi di lungo corso e gran cabotaggio.

Le navi sono divise in due categorie:

navi che trasportano più di 40 persone;

navi che trasportano meno di 40 persone.

La quantità del materiale deve essere raddoppiata se il viaggio dura da 6 a 12 mesi.

Per gli articoli seguiti da un asterisco (\*) la quantità deve rimanere costante, qualunque sia la durata del viaggio, salvo indicazioni contrarie.

Per gli articoli seguiti da doppio asterisco (\*\*), sulle navi petrolifere o imbarcanti carichi pericolosi, la quantità deve essere triplicata (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; decreto ministeriale 10 settembre 1969).

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	

## MEDICINALI PER USO INTERNO

ANALGESICI  
(Farmaci contro il dolore)

1) Morfina . . .	Fiale da 1 ml con 10 mg . . . Etichettare « STUPEFACENTE » Si trova tra gli stupefacenti affidati al comandante.	—	10	10	10	<i>Sempre e solo dietro consiglio medico, dato in chiaro</i> Eccezionalmente può essere somministrata una fiala intramuscolo, senza consiglio medico, in caso di violentissimo dolore retrosternale, che non passa in seguito alla somministrazione di due compresse di trinitrina.
2) Pentazocina .	Fiale da 1 ml, 30 mg . . . . . Compresse da 50 mg . . . . . Etichettare « STUPEFACENTE »	5 20	5 20	10 40	15 40	Può essere somministrata una fiala intramuscolo in caso di urgenza, quando l'origine del dolore è chiara (es.: fratture, ustioni); da non somministrare, senza consiglio medico, nei dolori addominali, negli stati di incoscienza, nei traumi cranici, nelle cefalee.

ANALGESICI - ANTIPIRETTICI E ANTIREUMATICI  
(Farmaci contro il dolore e contro la febbre)

3) A base di acido acetilsalicylico	Compresse 500 mg . . . . . Preferibilmente in forma incapsulata con etilcellulosa, atta ad evitare disturbi gastrici.	20	20	200	300	Una - due compresse, ripetibili ogni 6-8 ore, a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite o di ulcera gastrica.
4) A base di derivati pirazolomici	Compresse da 100 mg . . . . .	10	20	100	300	In caso di febbre o dolori di media entità (reumatismo, dolori muscolari, nevralgie, mal di testa e manifestazioni di tipo influenzale o da raffreddamento), una-due compresse, ripetibili ogni 8 ore, a stomaco pieno.
5) A base di ossifenbutazone	Confetti da 100 mg . . . . .	—	30	60	60	In caso di dolori articolari (artrosi), un confetto 3 volte al giorno, a stomaco pieno.

ANALGESICI ANTISPASTICI  
(Farmaci contro il dolore tipo colica)

6) A base di metilbromuro di Joscina	Discoidei 10 mg . . . . . Supposte 10 mg . . . . . Fiale 5 ml . . . . .	20 — 3	20 — 3	40 20 15	60 40 30	<i>In caso di dolori viscerali, tipo coliche di fegato, coliche renali, coliche intestinali, dolori premenstruali e mestruali, 1 discoide, ripetibile dopo 2 ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore:</i> oppure una supposta ripetibile dopo 2 ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore: oppure una fiala intramuscolare ripetibile dopo 4 ore. Se il dolore non passa, consultare, al più presto un medico.
--------------------------------------	---	--------------	--------------	----------------	----------------	---

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
<b>ANTIACIDI</b>						
7) A base di idrato di alluminio colloidale	Compresse da 500 mg . . . . .	—	50	100	100	Nei casi di acidità di stomaco: una-due compresse da masticare alla comparsa del bruciore di stomaco. Non presenta pericoli.
8) A base di bicarbonato di sodio	Polvere, in vasetti a tappo largo, da 50 gr	50	100	200	300	Nei casi di acidità di stomaco: mezzo cucchiaino da caffè in mezzo bicchiere di acqua, alla comparsa del bruciore di stomaco.
<b>ANTIASMATICI</b>						
9) A base di aminofillina	Confetti . . . . .	—	—	20	40	Da somministrare <i>solo dietro prescrizione medica</i> ; in caso di grave affanno (difficoltà di respiro), in attesa di mettersi in contatto col medico, somministrare una fiala intramuscolo.
	Fiale da 3 ml . . . . .	—	—	10	20	
<b>ANTIBIOTICI</b>						
10) Ampicillina . . . . .	Capsule, 250 mg . . . . .	—	—	60	120	La somministrazione non si deve <i>mai</i> iniziare urgentemente alla prima comparsa della febbre. In tali casi si consiglia di somministrare un antipiretico (n. 3) e consultare un medico.
	Flaconi 1 gr . . . . . più diluente 4 ml Scadenza	—	—	20	30	
11) Cefalosporina . . . . .	Capsule 500 mg . . . . .	—	—	24	24	(Vedi sopra).
	Flaconi iniettabili da 500 mg . . . . . Scadenza	—	—	10	20	
12) Cloroamfenicolo . . . . .	Capsule 250 mg . . . . . Scadenza	—	—	60	60	(Vedi sopra).
13) Penicillina . . . . .	Flaconi 1.000.000 U.I. . . . . Scadenza	—	—	50	100	Può dare reazioni allergiche, dall'orticaria allo shock; in questa eventualità tenere pronti l'adrenalina (n. 44) e il cortisone (numero 25). Da non somministrare ai pazienti con precedenti reazioni allergiche (orticaria, raffreddori da fieno).
14) Tetraciclina . . . . .	Capsule 250 mg . . . . .	—	—	100	150	La somministrazione non si deve <i>mai</i> iniziare urgentemente alla prima comparsa della febbre. In tali casi si consiglia di somministrare un antipiretico (n. 3) e consultare un medico.
	Fiale da 150 mg . . . . . Scadenza	—	—	12	12	
<b>ANTIBLENORRAGICI</b>						
15) A base di cloruro di spectinomina	Fiale 2 gr . . . . . Scadenza	—	5	20	30	Conservare in luogo fresco. Una fiala intramuscolare, da non ripetersi.

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
<b>ANTIDIABETICI</b>						
16) Insulina ad azione pronta per via ipodermica	Flaconi 400 U.I. . . . . .	—	1	2	3	Somministrare solo su consiglio medico, dato in chiaro: con siringhe apposite munite di ago ipodermico. L'uso dell'insulina è subordinato al controllo della glicemia e della glicosuria a mezzo delle strisce reattive, rispettivamente: Destrostix e Labstix.
<b>ANTIDIARROICI</b>						
17) A base di vioformio o equivalente	Compresse 200 mg . . . . .	10	20	60	100	In caso di diarrea persistente (con frequenti scariche) due compresse la prima volta, poi una compressa ogni 6 ore. In caso di persistenza, consultare un medico.
<b>ANTIEMORRAGICI</b>						
18) Antiemorragico fattore coagulante del sangue	Fiale da 5 ml . . . . .	5	5	15	20	In caso di emorragia abbondante e persistente, per esempio nasale o da estirpazione o caduta di un dente. Una fiala intramuscolo, ripetibile dopo due ore. In caso di ferita con emorragia abbondante e continua o a fiotti, anche dopo applicazione del laccio con le modalità prescritte più oltre (vedi n 131): una fiala intramuscolo dopo mezz'ora e poi dopo due ore. Inoltre può essere utile applicare sulla parte, garze sterili o cotone imbevuti del medicinale. In caso di emorragie viscerali (es.: emottisi, vomito di sangue emissione di feci nere) iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico.
19) A base di batroxobinum	Fiale da 1 ml . . . . . Scadenza	6	6	12	24	(Vedi sopra).
20) Emostatici uterini: a base di ergotamina	Gocce-flaconi 10 CC . . . . . Fiale da 1 ml - 0,2 mg . . . . .	—	—	1 6	1 6	In caso di emorragia mestruale abbondante e prolungata: 15 gocce 2 volte al giorno. Dietro consiglio medico, una fiala intramuscolo, ripetibile dopo 12-24 ore.
<b>ANTIPERTENSIVI - ANTISPASTICI - VASODILATORI</b>						
Antipertensivi:						
21) A base di reserpina	Compresse da 0,25 . . . . .	—	—	24	36	Da somministrare solo dietro prescrizione medica.
Antispastici:						
22) A base di paverina	Granuli 2 ctg . . . . . Fiale 4 ctg . . . . .	—	5 4	10 8	10 8	Da somministrare solo dietro prescrizione medica.

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
Vasodilatatori: 23) Trinitrina	Pillole da 0,3 mg . . . . Scadenza	—	70	140	140	In caso di dolore violento nella zona precordiale sinistra o retrosternale, esteso, eventualmente anche al braccio sinistro, con senso di angoscia, di costrizione toracica e di morte imminente. Una pillola da porre sotto la lingua e lasciare fino a completo assorbimento, da ripetere dopo 5 minuti, se occorre. Se il dolore persiste dopo due pillole di trinitrina, consultare con urgenza un medico. Qualora ciò sia impossibile, ricorrere alla morfina: una fiala intramuscolo di morfina ed una fiala intramuscolo di analgetico (v/n. 28).
<b>ANTISTAMINICI - ANTIALLERGICI</b>						
24) Antistaminici	Confetti da 4 mgr . . . . .	10	20	40	60	In caso di allergia tipo orticaria o in caso di raffreddore da fieno, somministrare tre confetti al giorno, ovvero secondo prescrizione medica.
25) Antiallergici Cortisone iniettabile (prednisolone)	Fiale da 20 mgr . . . . .	—	—	9	12	In caso di allergia grave, ivi compresa quella alla penicillina ed altri antibiotici, con respiro difficoltoso a tipo di asma, eruzioni cutanee tipo orticaria, diminuzione grave della pressione (collasso). Iniettare una-due fiale intramuscolo e consultare con urgenza un medico.
<b>ANTIMALARICI</b>						
26) Chinino bisolfato	Compresse da 200 mgr . . . . .	—	—	500	600	Come prevenzione per chi si reca nelle zone malariche: due compresse al giorno (per tutto il tempo dell'esposizione al rischio). Come terapia nei malati: due compresse ogni 6 ore o secondo prescrizione medica.
27) Cloroquina	Compresse da 250 mgr . . . . . N.B. — CONTROLLARE SOMMINISTRAZIONE.	—	—	50	100	<i>Profilassi:</i> una compressa due-tre volte la settimana per la durata del rischio e per tre settimane successive. <i>Terapia:</i> 6 compresse i primi due giorni; 3 compresse per altri due giorni; 2 compresse l'ultimo giorno.
<b>CARDIOTONICI (Farmaci per il cuore)</b>						
<i>Analettici</i>						
28) Analettici simpatico-mimetici	Discoidi 25 mgr . . . . . (Scatole da 20)	—	1	1	2	In caso di grave spossatezza con sensazione di svenimento o dopo svenimento: uno-due discoidi ripetibili dopo 8/12 ore.
	Fiale da 1 ml - 15 mgr . . . . . (Scatole da 6)	—	1	1	2	ovvero Una fiala intramuscolo in attesa di consiglio medico.

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
<i>Glicosidi - cardioattivi</i>						
29) Lanatoside C (dato in chiaro)	Confetti 0,25 mgr . . . . Fiale da 0,4 mgr . . . . Etichettare « VELENO »	—	—	40 6	40 12	Uso: da somministrare solo dietro prescrizione medica, data in chiaro.
<i>Regolatori del ritmo cardiaco</i>						
30) Chinidina (dato in chiaro)	Compresse 200 mgr . . . .	—	10	20	20	Somministrare solo su prescrizione medica, data in chiaro.
<b>DISINFETTANTI DELLE VIE URINARIE</b>						
31) A base di chemioterapici furadantini	Compresse da 50 mg . . . .	—	—	20	40	In caso di bruciori al momento dell'emissione di urina, con frequenti stimoli ad urinare; una compressa 4 volte al dì (ogni 6 ore), fino a due giorni dopo la scomparsa del disturbo. Se compare la febbre, consultare un medico.
<b>DIURETICI</b>						
32) A base di furose	Compresse 40 mg . . . . Fiale da 20 mg . . . .	—	20	30 10	40 10	Somministrare solo su consiglio medico.
<b>FARMACI CONTRO LA TOSSE</b>						
33) Codeina fosfato	Compresse 5 mg . . . . « VELENO »	10	20	100	200	In caso di tosse insistente, che impedisce anche il sonno: una compressa, 3 volte al giorno. Se compare febbre, consultare un medico.
34) Oxolamina	Sciroppo - flaconi . . . .	1	2	6	10	In caso di raffreddore con tosse: un cucchiaino - dose - ogni 6-8 ore per tre/quattro volte al giorno. Se compare febbre, consultare il medico.
<b>LASSATIVI</b>						
35) Compresse lassative a base di cascara sagrada o fenoltaleina o equivalenti		20	100	200	300	Lassativi in genere: in caso di stitichezza abituale evitare lo uso continuato di lassativi ed arricchire la dieta di frutta fresca e verdura. Una-due compresse (ripetibili una sola volta nelle 24 ore) la sera prima di coricarsi.
36) Lassativo liquido	Gocce - flaconi 10 ml	1	2	3	4	8-10 gocce ripetibili una sola volta nella 24 ore.
37) Sale inglese solfato di sodio	In vasetti a collo largo, con tappo smerigliato: gr	20	250	500	1000	Un cucchiaino o due in un poco di acqua tiepida la mattina a digiuno.
38) Supposte di glicerina		20	40	100	200	In caso di stitichezza. Prima di somministrare qualsiasi lassativo per via orale, tentare con l'applicazione di una-due supposte.
<b>SALE</b>						
39) Cloruro di sodio	Compresse 0,50 mgr . . . .	—	100	400	500	Da somministrare in caso di lavoro intenso e sudorazione profusa nelle zone calde (es.: aggiungendo tre-quattro compresse per ogni litro di acqua da bere).

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
<b>SEDATIVI</b>						
40) Antidepressivi a base di amitriptilina cloridrato	Capsule da 10 mgr . . . . .	—	—	60	60	Da somministrare solo dietro prescrizione medica.
41) Neuroplegici contro i disturbi mentali a base di clorpromazina	Compresse 25 mgr . . . . .	—	—	50	50	Da somministrare solo su prescrizione medica.
	Fiale 50 mgr . . . . . « VELENO »	—	—	5	5	
42) Sonniferi barbiturici	Compresse 50 mgr . . . . . « VELENO »	—	20	40	80	Da somministrare solo dietro consiglio medico.
43) Tranquillanti e sonniferi non barbiturici a base di benzodiazepina	Capsule 5 mgr . . . . .	—	—	20	40	In caso di stato di ansia o di irritabilità, una capsula mattino e sera. In caso di agitazione mentale, iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico.
	Fiale 10 mgr . . . . . « VELENO »	—	—	3	3	
<b>SIMPATICO - MIMETICI</b>						
44) Adrenalina . . .	Adrenalina cloridrato F.U. - Fiale da 1 ml (Soluzione 1:1000) Scadenza	—	—	6	6	In caso di reazione allergica grave con orticaria e grave difficoltà del respiro o collasso, iniettare una fiala intramuscolo, se possibile, dopo consiglio medico.
<b>SOLUZIONI PER USO ENDOVENOSO E/O IPODERMICO</b>						
45) Soluzione fisiologica	Flaconi da 500 ml . . . . .	—	2	3	6	In caso di abbondante perdita di liquidi a causa di ferite con conseguente emorragia, o nelle ustioni o schiacciamento di arti con accumulo di liquidi nella parte lesa; vomito persistente ed abbondante; diarrea persistente ed abbondante; nel caso di impossibilità ad assumere alimenti, sia solidi che liquidi, come primo intervento: somministrare sotto cute o endovena 1 flacone di soluzione fisiologica, facendo scendere il liquido alla velocità di 40-60 gocce al minuto. In seguito attenersi al consiglio medico.  <i>La somministrazione va fatta dietro istruzione medica e da persona abilitata.</i>
46) Soluzione glucosata 5%	Flaconi da 500 ml . . . . .	—	—	2	4	
47) Plasma liofilo con acqua bidistillata (sostituti del plasma)	Flaconi da 500 ml . . . . .	—	—	2	2	
<b>SULFAMIDICI</b>						
48) A base di succinil o ftalil-sulfatazolo (Sulfamidico gastro intestinale)	Compresse da 50 mgr . . . . .	—	20	60	100	Premesso: i sulfamidici in genere sono da usarsi solo su consiglio medico.

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
49) A base di sulfametossi pirazina	Compresse da 500 mgr . . . .	20	30	60	100	<i>Premesso: i sulfamidici in genere sono da usarsi solo su consiglio medico.</i> Per la prevenzione della meningite in caso di riconosciuto contatto con malati o sospetti: due compresse il primo giorno e, in seguito, una compressa ogni 24 ore.

## VITAMINE

50) Polivitaminici	Confetti . . . . .	—	40	100	100	In caso di terapia antibiotica, somministrare 2-3 confetti al giorno. Come ricostituente: 1-2 confetti al giorno.
51) Vitamina B <sub>1</sub> -B <sub>12</sub>	Fiale da 2 ml . . . . . B <sub>1</sub> -Cloridrato, 25 mg . . . . . B <sub>12</sub> -1000 mcg . . . . . Scadenza	—	—	10	10	In caso di dolori nevralgici praticare: una fiala intramuscolo ogni 24 ore.
52) Vitamina C	Compresse 500 mgr . . . . .	—	20	40	40	In caso di raffreddore o infezione delle vie respiratorie o infezioni in genere: una compressa al giorno integrando con terapia polivitaminica o d'altro genere; in caso di facile sanguinamento e facilità ad ammalarsi di affezioni infettive: due compresse al giorno.

## MEDICINALI PER USO ESTERNO

## COLLIRI

53) Collirio anestetico a base di ossibuprocaina	Flaconi con contagocce oftalmico 20 ml	1	2	3	4	Secondo prescrizione medica.
54) Collirio antisetico con solo antibiotico	Flaconi con contagocce oftalmico	—	—	2	2	(Vedi sopra).
55) Collirio antisetico con antibiotici e cortisone	Flaconi con contagocce oftalmico	1	2	3	4	(Vedi sopra).
56) Collirio a base di atropina	Flaconi con contagocce oftalmico 10 ml	—	—	1	1	Solo su <i>espressa indicazione del medico.</i>
57) Collirio per diminuire la tensione oculare, a base di pilocarpina	Flaconi con contagocce oftalmico 1% - 10 ml	—	—	1	1	Da usarsi nel caso di glaucoma, solo su <i>espressa indicazione del medico.</i>

## COLLUTORI

58) Antisetico per uso orale a base di jodio	Flaconi con contagocce 30 gr 5% « USO ESTERNO »	—	1	1	2	In caso di irritazione delle gengive e della parte interna delle guance e della lingua e, comunque, nei casi di infiammazione del cavo orale: 20 gocce in mezzo bicchiere d'acqua per sciacqui (non ingoiare).
--	--	---	---	---	---	--

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
<b>GOCCE</b>						
59) A base di naf-tilmetilimida-zolina nitrato (per il naso).	Flaconi con contagocce 10-15 ml	—	1	1	2	In caso di raffreddore con abbondante muco e naso chiuso: somministrare due gocce ogni narice, ogni 4-5 ore.
60) Gocce odontal-giche (contro il mal di denti)	Flaconi o fialette . . . . . « USO ESTERNO »	—	1	3	3	In caso di dolore provocato da denti cariati: applicare un batuffolo di cotone, imbevuto nel liquido del flaconcino o il contenuto della fiala, sul dente dolente.
61) Gocce per lo orecchio (a base di antibiotici e antinfiammatori)	Flaconi con contagocce 10 ml .	1	2	3	4	In caso di infiammazione dello orecchio, con dolore: due gocce in ogni orecchio, 3-4 volte al giorno. <i>Attenzione:</i> nel caso vi sia anche una secrezione muco-purulenta o si abbia febbre, consultare un medico.
<b>LOZIONI</b>						
62) Lozione anti-pruriginosa e antialergica (a base di benadril e calamina)	Flaconi da 60 ml . . . . .	—	1	2	2	Particolarmente utile quando la parte affetta sia coperta da peli e quindi difficilmente trattabile con pomate. Applicare 3-4 volte al giorno.
<b>POMATE</b>						
63) Crema anti-pruriginosa e anti-allergica	Tubetti da 30 gr . . . . .	1	2	3	5	Utile in caso di allergie della pelle con orticaria e prurito, utile anche in caso di puntura di insetti. Applicare 3-4 volte al giorno.
64) Pomata anestetica, a base di clorbutanolo	Tubetti da 30 gr, 1% . . . . .	—	—	1	1	Solo dietro prescrizione medica.
65) Pomata antibiotica e cortisonica	Tubetti da 20 gr . . . . .	1	2	3	3	Solo dietro prescrizione medica.
66) Pomata antiemorroidaria (a base di idrocortisone)	Tubetti da 15 gr . . . . .	—	1	2	3	Applicazioni locali: 2-3 volte al giorno.
67) Pomata fungicida	Tubetti da 20 gr . . . . .	—	1	1	2	Stesse indicazioni della lozione, ma per le superfici della pelle non coperte da peli.
68) Pomata contro le ustioni (1)	Tubetti da gr 30 . . . . .	1	2	3	3	Aglicare come primo intervento, sulla parte ustionata, coprire con garza sterile e consultare il medico.
69) Pomata solfoalcalina	Vasetti collo largo, gr 100 . . .	—	—	1	1	Secondo prescrizione medica.
70) Pomata uretrale cortisonica, anestetica antiflogistica	Tubi da gr 10 . . . . .	—	—	2	2	Solo dietro prescrizione medica.
71) Unguento sulfatico antireumatico	Vasetti a collo largo gr . . . . . « USO ESTERNO »	25	50	100	200	Da usarsi in caso di dolori reumatici articolari o di muscoli. <i>Attenzione:</i> da non usare sulla pelle ustionata o, comunque lesa.

(1) Per le navi petroliere e trasportanti materiali infiammabili: dotazione quintupla.

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
<b>POTABILIZZANTI DELL'ACQUA</b>						
72) A base di cloro (1)		—	—	—	—	Attenersi alle apposite istruzioni.
<b>DISINFETTANTI LIQUIDI PER USO ESTERNO</b>						
73) Acqua ossigenata 12 vol.	gr . . . . .	100	200	500	800	Usare solo sulla pelle circostante, <i>MAI</i> sulla ferita.
74) Alcool denaturato	litri . . . . .	1	1	5	8	
75) Tintura di iodio	gr . . . . .	50	50	100	200	
76) Altri disinfettanti a base di ammonio quaternario	litri . . . . .	1	1	5	5	
<b>INSETTICIDI</b>						
77) Insetticida ad azione residua	Flaconi da 1 litro . . . . . « VELENO »	1	2	6	10	
78) Liquido insetticida a base di piretro (2)	Flaconi piretrina 25% . . . . . « VELENO » - USO ESTERNO	—	—	—	—	
79) Polvere insetticida	Barattoli da 50 gr con pompetta aspersoria « VELENO » - USO ESTERNO	1	1	1	1	
<b>MATERIALE PER MEDICAZIONE E PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI</b>						
80) Ago e tubi plastica per ipodermoclisi sterili (in busta plastica)		—	1	1	1	
81) Ambu - pallone per rianimazione (* *)		—	1	1	1	
82) Ammoniaca F. U.	In flaconi di vetro scuro con tappo smerigliato - Cmc « USO ESTERNO » Etichetta	50	50	50	50	
83) Bacinelle di ferro smaltato rettangolare		—	1	1	1	
84) Bacinelle reniformi		—	—	2	2	
85) Barella in plastica a canoa		—	—	1	1	
86) Bende di cambric (m 5 x cm 8) (* *)		5	10	20	30	
87) Bende di cambric (m 8 x cm 10) (* *)		5	10	20	30	
88) Bende di musola idrofila (m 5 x cm 5) (* *)		2	5	10	20	

(1) A seconda dei quantitativi di acqua da trattare.

(2) Un flacone per ogni membro dell'equipaggio.

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
89) Bende di mus- sola idrofila (m 5 x cm 9) (* *)		2	5	10	20	
90) Bende di mus- sola idrofila (m 5 x cm 12) (* *)		2	5	10	20	
91) Benzina sgras- sante rettifica- ta	gr. . . . .	—	—	500	500	
92) Bicchieri d i ferro smaltato		—	—	2	2	
93) Bicchiere gra- duato a calice di vetro gr 250		—	1	1	1	
94) Bombola ossi- geno terapeuti- co - 11000 com- pleta di ma- schera, occhiali e gorgogliatore (* *)		—	—	1	1	
95) Borsa di gom- ma per acqua calda (* *)		—	1	2	3	
96) Borsa di tela gommata per ghiaccio (* *)		—	1	3	5	
97) Bottiglie conta- gocce cmc 25		—	1	4	8	
98) Bottiglie di ve- tro cmc 200		—	1	1	1	
99) Bottiglie di ve- tro cmc 500		—	1	1	1	
100) Busta chirur- gica in metallo contenente:	<p>           aghi di sutura atraumatici, già            pronti            forbice chirurgica curva            forbice chirurgica retta            manico da bisturi con lame in-            intercambiabili            pinza anatomica            pinza emostatica di Klemmer            pinza emostatica Pean            pinza porta aghi            n. 2 pinze a denti di topo (Du-            rante)            porta caustico con cannello di            nitrato d'argento            porta stuelli per medicazione            degli orecchi            seta per sutura n. 0; 1 e 2 (tu-            betti sterili)            sonda scanalata            specillo         </p>					
101) Cappa bianca per medico		—	—	1	1	
102) Casseruola di ferro smaltato cmc 500		—	1	1	1	

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
103) Cateteri di gomma molle nelaton (due a curva di Mercier)		—	3	5	8	
104) Catetere uretrale autofissante (sterile)		—	—	3	3	
105) Cerotto adesivo (rotoli m 5 x cm 2,5) (* *)		1	2	4	6	
106) Cerotto adesivo medicato in contenzioni assortite (scatola da 40 pezzi) (* *)		1	1	3	5	
107) Cerotto adesivo (rotoli da m 5 x cm 5) (* *)		1	1	3	5	
108) Cinti ernari assortiti nelle varie misure		—	1	2	3	
109) Cognac	litro . . . . .	—	—	1	1	
110) Contagocce tubolari con gomma		—	2	6	12	
111) Cotone emostatico gr . . . . . (* *)	gr . . . . .	10	20	40	60	
112) Cotone idrofilo	Pacchi da gr 250 . . . . .	1	2	5	10	
113) Cucchiaini di ossido	(da gr 5 di sale) . . . . .	—	1	1	1	
114) Cucchiaini di ossido	(da gr 20 di sale) . . . . .	—	1	1	1	
115) Cucchiaini da zuppa comune in metallo bianco		—	1	1	1	
116) Elenco dei dispensari dermatocellitici e per la cura delle malattie veneree nei porti	Pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità	—	1	1	1	
117) Etere solforico	In boccette da gr 100 con tappi di sughero	—	—	2	2	
118) Enteroclisma completo		—	1	1	1	
119) Etichette varie		—	20	50	100	
120) Ferule di fil di ferro orlate		—	—	1	1	
121) Fogli per registrazione temperature		—	5	10	20	

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
122) Forbice comune		—	1	1	1	
123) Fornelletto ad alcool in metallo		—	1	1	1	
124) Frigidaire elettrico per la conservazione degli antibiotici e dei medicinali sottoposti a scadenza (cm 50 x 40 x 40)		—	—	1	1	
125) Garza idrofila in compresse da (* *)	cm 12 x 15 sterilizzata (buste impermeabili da 10 compresse)	1	2	5	10	
126) Garza idrofila in compresse da (* *)	cm 30 x 40 sterilizzata (buste impermeabili da 10 compresse)	1	2	5	10	
127) Garze antibiotiche vaselinate (* *)	scatole 5 x 5 . . . . .	—	—	2	2	
	scatole 10 x 10 . . . . .	—	—	3	3	
128) Guanti per uso chirurgico	Paia . . . . .	—	2	4	6	
129) Guttaperca laminata (* *)	(buste da 1 metro) . . . . .	1	2	5	10	
130) Imbuto di vetro		—	1	1	1	
131) Laccio emostatico di Esmarck		—	1	1	2	Applicare il laccio a monte della ferita, nel caso che il sangue sia rosso vivo ed esca a fiotti; applicare invece a valle della ferita, nel caso il sangue sia rosso scuro ed esca a getto continuo.
132) Lavaocchi di vetro		—	1	1	1	
133) Manuale di pronto soccorso	(Guida internazionale di bordo)	—	1	1	1	
134) Pacchetti sterili - medicazione preparata: (* *)	tipo 18 x 40 . . . . .	1	1	5	10	
	tipo 10 x 10 . . . . .	1	1	5	10	
135) Padella di ferro smaltato	(Forma di pala) . . . . . (*)	—	1	1	1	
136) Pappagallo di plastica per uomo	(*)	—	1	1	1	
137) Pera di gomma	da gr 200 . . . . . (*)	—	—	1	1	
138) Potassio permanganato	Compresse da 0,25 . . . . .	—	—	50	100	

Articolo	Istruzioni per il farmacista-rifornitore	A	B	C		Istruzioni per l'uso
				- 40	+ 40	
139) Scatola per sutura metallica alla Mitchel (*)	(completa di pinze, punti ed uncin)	—	1	1	2	
140) Sfigmomanometro anerode a bracciale		—	—	1	1	
141) Siringa per lavaggio auricolare		—	—	1	1	
142) Siringa in plastica:						
da 2,5 cmc		3	10	60	100	
da 5 cmc		—	—	20	40	
da 10 cmc (*)		—	—	5	10	
143) Sondino naso-gastrico		—	—	1	1	
144) Sospensori a maglia (*)		—	1	1	1	
145) Spatole di osso (*)		—	1	1	1	
146) Spatoie di ferro (*)		—	1	1	1	
147) Spazzolini da unghie		—	1	1	2	
148) Spilli di sicurezza assortiti (*)		5	10	20	40	
149) Stecche palmari in legno (*)		—	1	2	5	
150) Stecche per fratturati di diversa forma e grandezza (*)		—	1	4	8	
151) Sterilizzatore elettrico (misura: 18 x 5 x 8 cm) (*)		—	—	1	1	
152) Strisce reattive per ricerche varie, in unica soluzione: - albumina - sangue - glucosio - acetone (* *)		—	—	1	1	
153) Termometri clinici (*)		—	1	1	1	
154) Vasetti per sapone molle (*)		—	—	2	2	

Il Ministro per la sanità  
DAL FALCO